



Komunikat sadowniczy SKS 17 2015-07-22

PARCH JABŁONI

W sadach, w których obecne są plamy parcha na liściach i owocach, zalecana jest regularna ochrona zapobiegawcza. Warto pamiętać, że nawet rosa sprzyja infekcjom wtórnym. Zalecamy stosowanie środków kontaktowych: **Delan 700 WG** 0,5 kg/ha, **Captan 80 WG** 1,9 kg/ha, **Kaptan Zaw. 50 WP** 3kg/ha, **Indofil 80 WP** 3 kg/ha, **Dithane NeoTec 75 WG** 2 kg/ha, **Thiram Granuflo 80 WG** 3kg/ha lub **Pomarsol Forte 80 WG** 3kg/ha.

W warunkach słabszej presji ze strony parcha jabłoni polecamy stosowanie aktywatora naturalnej odporności **Kendal w dawce 2,5 l/ha** naprzemiennie z zabiegiem fungicydem zapobiegawczym.

MSZYCE

W sadach występują bardzo liczne kolonie mszycy jabłoniowej. Zalecamy zabieg jednym z produktów: **Actara 25WG** 0,1 kg/ha, **Calypso 480SC** 0,2l/ha lub **Mospilan 20SP** 0,125 kg/ha.

W przypadku występowania mszycy jabłoniowo-babkowej lub bawełnicy korówki zalecamy zabieg jednym z preparatów: **Actara 25WG** 0,2 kg/ha, **Pirimor 500WG** 0,75kg/ha lub **Movento 100SC** 2,25l/ha.

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA ORAZ ZWÓJKI LIŚCIOWE

Nadal aktualnym problemem są zwójki liściowe, w tym owocówka jabłkóweczka. Zalecamy dodatkowy zabieg zwalczający te szkodniki jednym z preparatów:

Affirm 095 SG 2,5-3 kg/ha, **Runner 240 SC** 0,4 l/ha, **Steward 30 WG** 0,17-0,2 kg/ha, **Coragen 200SC** 0,175 l/ha.

PRZĘDZIORKI

W niektórych sadach przędziorki występują w bardzo dużym nasileniu. W przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy zabieg: **Sumo 10EC** 1l/ha, **Ortus 05SC** 1l/ha + **Nissorun 050EC SC** 0,9 l/ha, **Envidor 240SC** 0,4 l/ha, **Zoom 110SC** 0,45 l/ha lub **Afik** 0,3%.

ADIUWANTY

Dla poprawienia skuteczności zabiegów insektydami wskazane jest stosowanie adiuwantów silikonowych. W chwili obecnej, kiedy korony drzew są szczelnie pokryte liśćmi stosowanie adiuwantów może decydować o skuteczności zabiegów ochrony przed szkodnikami. Do każdego zabiegu insektydami zalecamy dodanie preparatu **Asystent+** w dawce 0,1 l/ha.

DOKARMIANIE JABŁONI

W obecnym okresie zalecane jest nawożenie pozakorzeniowe jabłoni nawozami bogatymi w magnez, potas oraz fosfor. Polecamy stosowanie gotowych nawozów **FruitAkademia na wzrost owoców I** przemiennie z **FruitAkademia na wzrost owoców II**. Wymienione nawozy można łączyć z zabiegami fungicydowymi. Produkty z linii **FruitAkademia** stosowane zgodnie z zaleceniami są bezpieczne w stosowaniu nawet w okresach wysokich temperatur.

DOKARMIANIE WAPNIEM

Zalecamy kontynuację nawożenia produktami wapniowymi. W obecnym okresie optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie formułowanych produktów wapniowych takich jak **Amiwap** lub **Nano Activ**. Produkt te są bezpieczne nawet w wysokich temperaturach (powyżej 25°C). Zalecana dawkowanie **Amiwap 2,5 l/ha** lub **NanoActiv 3 kg/ha**.

W przypadku stosowania chlorku wapnia do każdego zabiegu polecamy dodawanie produktu zawierającego aminokwasy roślinne **Megafol** w dawce 1l/ha.