



Komunikat sadowniczy SKS 20 2015-09-08

CHOROBY PRZECHOWALNICZE

Ochłodzenie z którym przyszły miejscowe przelotne opady sprawiają, że ochronę przeciw chorobom przechowalniczym należy potraktować poważnie. Poniżej przedstawiono dwa programy ochrony jabłek:

na 4 tygodnie przed zbiorem: **Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha + **Bellis 38 WG** w dawce 0,8 kg/ha,
na 2 tygodnie przed zbiorem **Bellis 38 WG** w dawce 0,8 kg/ha;

lub wariant drugi, szczególnie przy zamiarze długiego okresu przechowywania owoców:

na 4 tygodnie przed zbiorem: **Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha lub **Kaptan 50 WP** w dawce 3 kg/ha,
na 3 tygodnie przed zbiorem: **Bellis 38 WG** w dawce 0,8 kg/ha,
na tydzień przed zbiorem: **Switch 62,5 WG** w dawce 0,75 kg/ha lub **Geoxe 50 WG** w dawce 0,45 kg/ha.

PRZEDZBIORCZE POZAKORZENIOWE NAWOŻENIE JABŁONI

Niekorzystne warunki pogodowe występujące przez cały sierpień miały negatywny wpływ na skuteczność nawożenia. Należy się spodziewać, że mogą wystąpić problemy z przechowaniem owoców wynikające z niedoboru wapnia w owocach. Wskazane jest teraz zadbać o uzupełnienie nawożenia owoców produktami wapniowymi. Zalecamy stosowanie nawozów wapniowych w wyższych dawkach:

Amiwap w dawce 5 l/ha

lub w przypadku dogodnych warunków pogodowych, gdy temperatury za dnia nie przekracza 20°C, chlorek wapnia w dawce 10-12 kg/ha. Do każdego zabiegu chlorkiem wapnia należy dodawać **Megafol w dawce 1 l/ha**. Dodatek **Megafolu** poprawia i przyspiesza pobierania składników pokarmowych.

Bardzo dużym problemem może okazać się wybarwienie jabłek – w wielu sadach owoce są wciąż niedostatecznie wybarwione. W celu poprawy wybarwienia należy wykonać zabiegi: nawozem **FruitAkademia na wzrost owoców II** w dawce 8 kg/ha, zawierającym fosfor i potas oraz biostymulatorem **Sweet** dwukrotnie co 7-10 dni w dawce 2-2,5 l/ha

W sadach które nadal odczuwają skutki niedoboru wody i wysokich temperatur, zalecany jest zabieg obniżający negatywną reakcję na skutki stresu z dodatkiem nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy zastosowanie preparatu **Megafol 2,5 l/ha** z dodatkiem nawozu **OptiMikro 2,5 kg/ha**.

SZARA PLEŚŃ W MALINACH JESIENNYCH

Utrzymujące się rosy i przelotne opady sprzyjają rozwojowi szarej pleśni na malinach. Zalecamy w pierwszym dogodnym terminie wykonanie zabiegu jednym z poniższych preparatów:

Mythos 300 SC - 2,5 l/ha

Signum 33 WG - 1,8 kg/ha

Switch 62,5 WG - 0,8 kg/ha

Teldor 500 SC - 1,5 l/ha

Należy zwracać uwagę na okresy karencji stosowanych preparatów.

SKS 20 Przechowalnicze: Captan 1,9kg/Bellis 0,8kg Dolistnie: FA_wzrost_owocow_II 8kg; Wapn: Amiwap 5L/Chlorek 10kg+Megafol 1L; Wybarwienie: Sweet 2L; Susza: Megafol 2,5L+OptiMicro 2,5kg; Maliny: Mythos 2,5L
http://zzowarka.pl/download/SKS_20_2015.pdf